



جمهوری اسلامی ایران
وزارت جهاد کشاورزی
سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی
 مؤسسه تحقیقات چنگلها و مراتع

فصلنامه پژوهشی تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران

جلد ۲۰ شماره ۳ سال ۱۳۸۳

فهرست مطالب

شاخص‌های رشد برخی گونه‌های گیاهان دارویی در شرایط مختلف تنش خشکی ۲۴۹.....
محمد حسین لیاسچی و ابراهیم شریفی عاشورآبادی بررسی تغییرات متabolیسم حاصل از تشهی خشکی در گیاه مرزه ۲۶۳.....
زهراباهرنیک، محمدباقر رضایی، مدهقا قربانی، فاطمه عسگری و محمدکاظم عراقی بررسی اثرات ضد میکروبی اسانس گیاه مورخوش ۲۷۷.....
محمدامین سلطانی پور، محمدباقر رضایی و علی مرادشاهی عنصر معدنی در زنوبیهای مختلف ۲۹۱.....
محمدباقر رضایی، محمود نادری حاجی باقرکنانی، سید رضا طبایی عقدایی درصد، سرعت جوانه‌زنی و شاخص بنته دو گونه گیاه دارویی (Rosa damascena Mill.) استانهای تهران، آذربایجان شرقی و گلستان ۳۰۱.....
محمدباقر رضایی درستگاری و (Anthemis altissima L.) ۳۰۱.....
محمدعلی علیزاده و حمیدرضا عیسیوند بررسی اثر عصاره الکلی بذر گیاه تاتوره بر درد حاصل از آزمونهای فرمالین و صفحه داغ در موشهای صحراوی نر ۳۰۹.....
محسن خلیلی نجف‌آبادی و سید مسعود اطیابی تعیین میزان ژوگلون در برگ و میوه سیز درخت گردو (Juglans regia L.) ۳۲۳.....
توسط کروماتوگرافی مایع با کاربی بالا (HPLC) کامکار جایمند، پروین تقایی، محمدباقر رضایی، سیدابوالفضل سجادی پور و ملیحه نصرآبادی ۳۳۳.....
مطالعه تنوع در عملکرد گل محمدی (Rosa damascena Mill.) مناطق غربی کشور سید رضا طبایی عقدایی و محمدباقر رضایی گیاهان دارویی استان زنجان ۳۴۵.....
احمد موسوی تأثیر نحوه مصرف کود نیتروژنی بر عملکرد گیاه دارویی با درنجه‌بیوه (Melissa officinalis) ۳۶۹.....
ابراهیم شریفی عاشورآبادی، ابوالقاسم متین، محمدحسین لیاسچی و بهنول عباسزاده بررسی فیتوشیمیایی گل گاوزبان (Echium amoenum) ۳۷۷.....
محمود نادری حاجی باقرکنانی و محمدباقر رضایی ۳۸۹.....

بسم الله الرحمن الرحيم

فصلنامه پژوهشی تحقیقات گیاهان دارویی و محطر ایران

- صاحب امتیاز: مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع
- مدیر مسئول: عادل جلیلی (دانشیار، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع)
- سردبیر: محمد باقر رضایی (دانشیار، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع)

- هیأت تحریریه (به ترتیب حروف الفبا)

پرویز باباخانلو استاد، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع	پرویز اولیاء دانشیار، دانشگاه شاهد
حسین حیدری شریف آباد دانشیار، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع	نادر حسن زاده دانشیار، مرکز علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی
محمد باقر رضایی دانشیار، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع	ایرج رسولی دانشیار، دانشگاه شاهد
پیمان صالحی دانشیار، دانشگاه شهید بهشتی، پژوهشکده گیاهان دارویی	محمد رضا ضامن اردکانی دانشیار، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
محسن کافی استادیار، دانشگاه تهران - دانشکده کشاورزی	سید رضا طبائی عقدائی استادیار، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع
مه لقا قربانی استاد، دانشگاه تربیت معلم	فریبهر معطر استاد، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان

مدیر اجرایی و داخلی: کامکار جایمند استادیار، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع
دبیر کمیته انتشارات مؤسسه: شاهرخ کریمی

تیراژ: ۱۵۰۰ جلد

ویراستار ادبی: هوشنگ فرخجسته

صفحه آر: سارا شیراسب

ناظر فنی: شاهرخ کریمی

لیتوگرافی، چاپ و صحافی: فرشیوه

هیأت تحریریه، در رد، مختصر کردن و ویرایش مقالات مجاز است. همچنین مقالات ارسالی عودت داده نمی شود.

* نقل مطالب و تصاویر نشریه با ذکر مأخذ بلامانع است.

نحوه اشتراک: تکمیل فرم اشتراک و ارسال آن به آدرس فصلنامه از طریق پست.

نشانی: تهران، کیلومتر ۵ آزاد راه تهران - کرج، خروجی پیکان شهر، انتهای ۲۰ متری دوم، بلوار مؤسسه تحقیقات

جنگلها و مراتع، **فصلنامه پژوهشی تحقیقات گیاهان دارویی و محطر ایران**

صندوق پستی ۱۳۱۸۵-۱۱۶، تلفن: ۰۰۵۹۰۱-۴۱۹۵۰۷ نمبر:

ijmapr@rifr.ac.ir

بهاء: ۱۸۰۰۰ ریال

خلاصه مقاله های انگلیسی این مجله در سایت اینترنتی **CABI Publishing** به آدرس زیر
قرار گرفته است:

www.Cabi-Publishing.org

بسمه تعالیٰ

راهنمای نگارش مقاله

- رعایت دستورالعمل زیر در نگارش مقاله‌های ارسالی ضروری است.
- مقاله‌های اصیل (Original) پژوهشی در یکی از زمینه‌های تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران که برای نخستین بار منتشر می‌شود جهت چاپ در مجله مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
 - عنوان مقاله، نام و نام خانوادگی، سمت و آدرس کامل نویسنده (گان) در یک صفحه جداگانه درج گردد.
 - مقاله در کاغذ A4 تحت نرم افزار WORD، فونت لوتوس، سایز ۱۲، با حاشیه ۳ سانتیمتر از چهار طرف تایپ و در ۲ نسخه همراه با دیسکت یا از طریق پست الکترونیک ارسال شود.
 - فاصله بین خطوط دو برابر در نظر گرفته شود.
 - تا حد امکان از بکاربردن کلمات و اصطلاحات خارجی خودداری و در صورت نیاز با قید شماره بهصورت پاورقی ارائه شود.
 - جداول و اشکال باید دارای عنوان گویا بوده و هرگز بهصورت دیگری در مقاله تکرار نشوند. ذکر منبع، واحد و مقیاس برای آنها ضروری است، عنوان جداول در بالا و عنوان اشکال در پایین ارائه می‌شوند. جداول و اشکال در صفحات مستقل و در انتهای مقاله ارائه شوند.
 - نامهای علمی لاتینی بهصورت ایتالیک تایپ شوند.

روش تدوین

- عنوان مقاله: باید مختصر، گویا و بینگر محتوی مقاله باشد.
 - چکیده: مجموعه فشرده‌ای (حداکثر ۲۵۰ کلمه) از مقاله شامل تشریح مسئلله، روش کار و نتایج بدست آمده است. از بکاربردن نامهای خلاصه شده و ارائه منبع، جدول و شکل در چکیده پرهیز شود.
 - واژه‌های کلیدی: حداقل ۶ واژه درباره موضوع مقاله ارائه شود.
 - مقدمه: شرحی بر موضوع مورد بررسی شامل اهمیت، فرضیه، هدف و پیشینه تحقیق است.
 - مواد و روشهای شامل مواد و وسائل بکاررفته، مشخصات منطقه مورد مطالعه، شیوه اجرای پژوهش، طرح آماری، روشهای شناسایی و تجزیه داده‌هاست.
 - نتایج: در این بخش تمامی یافته‌های کمی و کیفی با استفاده از جدول و شکل ارائه می‌گردند. از بحث و مقایسه با یافته‌های سایر تحقیقات اکیداً خودداری شود.
 - بحث: شامل تحلیل و تفسیر یافته‌ها و مقایسه با نتایج سایر تحقیقات است. نقصها و پیشنهادها می‌توانند در صورت نیاز در این بخش ارائه شوند.
 - سپاسگزاری: در صورت نیاز از کلیه افراد و سازمانهای حمایت کننده تحقیق، تشکر گردد.
 - منابع مورد استفاده:
- فقط منابع استفاده شده در متن قید شوند. ابتدا منابع فارسی و سپس منابع خارجی ارائه شوند.
 - منابع به ترتیب حروف الفبا نام خانوادگی نویسنده مرتب و بهصورت پیوسته شماره گذاری شوند.

- ارائه منبع در متن تنها با ذکر نام خانوادگی نویسنده و سال انتشار منبع صورت می‌گیرد. در منابع با بیشتر از دو نویسنده، نام نویسنده اول و کلمه «همکاران» یا «et al.» نوشته شود.
- در صورتی که مقاله‌های منفرد و مشترک از یک نگارنده ارائه شوند، ابتدا مقاله‌های منفرد و سپس مقاله‌های مشترک به ترتیب حروف الفبا نام سایر نویسنده‌گان مرتب شوند.
- چنانچه نویسنده (گان) چند مقاله مشابه باشند، منابع بر حسب سال انتشار از قدیم به جدید تنظیم شوند.
- از ذکر واژه‌های «همکاران» یا «et al.» در فهرست منابع خودداری شود.

روش ارایه منبع

- ۱- مقاله: نام خانوادگی، حرف اول نام نویسنده اول، ... و نام خانوادگی، حرف اول نام نویسنده آخر، سال انتشار. عنوان مقاله. نام کامل مجله، شماره جلد (شماره سری): شماره صفحات اول و آخر
مثال: سلاجقه، ع.، جعفری، م. و سرمدیان، ف.، ۱۳۸۱. مطالعه خاکشناسی منطقه طالقان با روش ژئومرفولوژی. مجله منابع طبیعی ایران، ۵۵(۲): ۱۴۳ - ۱۲۳.

Wayne, P.M., Waering, P. and Bazzaz, F.A., 1993. Birch seedling responses to daily time courses of light in experimental forest gaps and shadehouses. *Journal of Ecology*, 74(5): 1500 – 1515.

- ۲- کتاب: نام خانوادگی، حرف اول نام، ... نام خانوادگی، حرف اول نام نویسنده آخر، سال انتشار. عنوان کامل کتاب. ناشر، محل انتشار، تعداد کامل صفحات.

مثال: طباطبائی عقایی، س.ر. و جعفری مفیدآبادی، ع.، ۱۳۷۹. مقدمه‌ای بر اصلاح درختان جنگلی. انتشارات مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع، تهران، ۱۴۹ صفحه.

Jalili, A. and Jamzad, Z., 1999. Red Data Book of Iran. A Preliminary Survey of Endemic, Rare and Endangered Plants species in Iran. Research Institute of Forests and Rangelands (RIFR) Publication, Tehran, 750 p.

- ۳- کتاب یا مجموعه مقاله‌ای که هر فصل یا مقاله آن توسط یک یا چند نویسنده نوشته شده باشد: ارائه نام نویسنده (گان) فصل یا مقاله مطابق دستورالعمل بند ۲ (کتاب)، سال. عنوان فصل یا مقاله، صفحات اول و آخر. در (In: نام خانوادگی، حرف اول نام مؤلف اصلی کتاب، (ed. یا eds.). عنوان کتاب. ناشر، محل انتشار، تعداد کامل صفحات.

مثال:

Agestam, E., 1995. Natural regeneration of beech in Sweden – Some results from a field trial. 117 – 124. In: Madsen, F., (ed.). Genetics and Silviculture of Beech. Forskingscentret for Skov & Landskab. 272 p.

خلاصه انگلیسی (Abstract): می‌تواند معادل چکیده فارسی و یا بیشتر از آن و شامل عنوان مقاله، نام خانوادگی، حرف اول نام، سمت و آدرس نویسنده (گان) و واژه‌های کلیدی حداقل ۶ کلمه (Key words) بوده و در یک صفحه جداگانه ارائه شود.

* جزئیات کاملتر روش نگارش در سایت اینترنتی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع www.rifr.ac.ir قابل دسترس است.

بررسی اثر عصاره الکلی بذر گیاه تاتوره بر درد حاصل از آزمونهای فرمالین و صفحه داغ در موشهای صحرای نو

محسن خلیلی نجف‌آبادی^۱ و سید مسعود اطیابی^۱

چکیده

گیاه تاتوره در کتابهای پژوهشی کهن ایران و در سالهای اخیر توسط محققان امروزی گونه‌های خاصی از این گیاه به عنوان گیاه ضد درد معروفی شده است. مشخص شده است که قسمتهای مختلف این گیاه بهخصوص بذر آن حاوی آلکالوئیدهای مختلف می‌باشد. با توجه به تداخل سیستم اوپیوئیدی با مواد مختلف و از جمله مهمترین آنها آلکالوئیدها یا مواد قلیابی و نقش واضح سیستم اوپیوئیدی در کنترل درد، تحقیق حاضر به مطالعه اثر عصاره الکلی بذر گیاه تاتوره به عنوان غنی‌ترین جزء این گیاه در تسکین دردهای حاد و مزمن پرداخته است. برای ایجاد دردهای حاد و مزمن یا التهابی از آزمونهای صفحه داغ و تزریق فرمالین استفاده شد. بررسی بذر گیاه، پس از عصاره‌گیری از بذر گیاه، عصاره از طریق داخل صفاقی تزریق و به‌دلیل آن آزمونهای درد صورت می‌گرفت. با اعمال میزان‌های متفاوت عصاره در دو نوع آزمون فوق میزان‌های مؤثر (ED₅₀) ۵۰ و ۲۵ میلی‌گرم به ازای هر کیلوگرم به ترتیب در تحت درمان با عصاره حدود ۲۰ دقیقه قبل از آزمون درد تزریق و آزمون درد انجام می‌پذیرفت. میزان درد موشهای عصاره گرفته با میزان درد موشهای کنترل (بدون دریافت عصاره) با کمک آزمون Student *t*-test تحلیل و با $P < 0.05$ معنی‌دار بودن تفاوت در درد گروه در نظر گرفته شد. نتیجه آزمون آماری داده‌های مطالعه نشان داد که میزان درد حاد و مزمن حاصل از آزمون فرمالین و همچنین درد مرحله یک حاصل از آزمون صفحه داغ به میزان قابل توجهی توسط عصاره الکلی گیاه تاتوره کاهش می‌یابد. علاوه بر این، با اعمال میزان‌های افزایشی تاتوره از ۴۰۰۰ mg/kg-۵۰۰ به شکل داخل صفاقی میزان مرگ و میر موشها بررسی شد که نتیجه آن میزان کشنده متوسط (LD₅₀) حدود ۲۵۰۰ mg/kg بودست آمد.

به‌طور کلی نتایج آزمایش‌های ما با عصاره الکلی گیاه تاتوره نشان داد که درد حاد و مزمن حاصل از آزمونهای فرمالین و صفحه داغ توسط عصاره الکلی این گیاه به شکل معنی‌داری کاهش پیدا می‌کند. همچنین با توجه به فاصله زیاد بین میزان مؤثر و میزان کشنده، شاید بتوان بذر گیاه تاتوره را به عنوان ماده ضد درد معروفی کرد.

واژه‌های کلیدی: درد، تاتوره، آزمون فرمالین، آزمون صفحه داغ

۱- استادیار گروه فیزیولوژی دانشکده پژوهشی دانشگاه شاهد.

مقدمه

درد به عنوان شایعترین شکایت بالینی دارای گستره، تنوع و علل متفاوتی می‌باشد که به رغم گستردگی استفاده از مسکن‌ها هنوز در درمان آن دچار مشکل هستیم. از جمله این مشکلات آثار سوء و عوارض نامطلوبی است که داروهای ژنریک بر بدن بیماران می‌گذارند. بنابراین در دهه‌های اخیر استفاده از پزشکی سنتی به خصوص گیاه درمانی مد نظر محققان قرار گرفته است (Andrew *et al.*, ۱۹۹۶).

گیاه تاتوره در پزشکی قدیم ایران به عنوان یکی از گیاهان ضد درد معروف شده است (عقیلی خراسانی، ۱۳۷۱). در سالهای اخیر در جوامع اروپایی و آمریکایی به عنوان ماده مخدر و توهمند زا مورد استفاده قرار می‌گیرد (Schulman *et al.*, ۱۹۹۸). اگرچه مصرف بی‌رویه این گیاه (در انسان به شکل سیگار) موجب بروز عوارضی مانند افزایش فعالیت ترشحی و حرکت دستگاه گوارش، خشکی دهان، بالا رفتن دم و بازدم و مدریاز می‌کند (Hasan *et al.*, ۱۹۸۷) اما گزارشی مبنی مرگ و میر ناشی از مصرف بی‌رویه این گیاه ارائه نشده است (Piva *et al.*, ۱۹۹۵). بررسیهای انجام گرفته به وسیله محققان نشان داده است که ترکیبی‌ای آلکالوئیدی و قلیایی موجود در این گیاه عامل اصلی بروز چنین علائمی هستند (Schulman *et al.*, ۱۹۹۸). تحقیقات نشان داده است که گونه‌های Abena خاصی از گیاه تاتوره مانند *Datura fastuosa* دارای اثرات ضد دردی می‌باشند (Abena *et al.*, ۲۰۰۳)، حتی در کشورهایی مانند چین استفاده از این گیاه به عنوان بی‌حسن کننده موضعی جهت آکوپانکچر مرسوم شده است (Young, ۱۹۹۷). با توجه به نوع ترکیبی‌ای آلکالوئیدی گیاه تاتوره که بیشتر اثرات ضد کولینرژیکی از خود نشان می‌دهند، احتمالاً اثر ضد دردی این تیره گیاهان از طریق تداخل با سیستم اوپیوئیدی مسؤول تعدیل درد باشد (Lewis *et al.*, ۱۹۸۳). از مطالعه دیگران گزارش شده است که بین سیستم اوپیوئیدی و کولینرژیکی یک تولرانس متناطع وجود دارد (Pert *et al.*, ۱۹۷۵) و مسیرهای اوپیاپی از CNS غنی از گیرنده‌های

کولینرژیکی می‌باشد که احتمالاً نقش این سیستم را تعدیل درد نشان می‌دهد (Behbehani *et al*, ۱۹۸۲). به علاوه، گزارش‌هایی مبنی بر تقویت اثر ضد دردی مرفین توسط آنتی‌کولینرژیکها (Thor *et al*, ۲۰۰۰)، همه تأکید بر این نکته دارند که گیاه تاتوره به عنوان منبعی غنی از ترکیب‌های آکالولئیدی می‌تواند توانایی ایجاد اثرات ضد دردی را داشته باشد.

براساس مطالب مذکور در تحقیق حاضر اثر عصاره الکلی بذر گیاه تاتوره به عنوان غنی‌ترین منبع آکالولئیدی این گیاه (Schulman *et al*, ۱۹۹۸) به عنوان یک ترکیب ضد درد برروی درد حاد حاصل از آزمون صفحه داغ و تزریق فرمالین و همچنین درد مزمن یا التهابی حاصل از آزمون فرمالین بررسی شده است.

مواد و روشها

حیوانات مورد آزمایش:

در این مطالعه از موش‌های صحرایی (Rat) نر از جنس NMRI در محدوده وزنی ۳۵۰-۳۰۰ گرم استفاده شد. حیوانات در شرایط دمایی و طول شب و روز یکسان با دسترسی آزاد به یک نوع آب و غذا نگهداری می‌شدند. لازم به ذکر است که از هر حیوان فقط در یک آزمون استفاده می‌شد. به طور کلی حیوانات این مطالعه به دو گروه ۱- آزمون درد با صفحه داغ ($n=9-7$) برای هر میزان مورد استفاده) و ۲- آزمون درد با تزریق فرمالین ($n=12-9$) برای هر میزان مورد استفاده) تقسیم شدند. هر یک از گروه‌ها به دو زیر گروه کنترل (عدم دریافت عصاره) و عصاره گرفته تقسیم می‌شدند. برای بدست آوردن میزان کشنده متوجه عصاره از موش‌های جداگانه‌ای به طبق جدول شماره ۱ استفاده شد. (۱۲-۹ برای هر میزان مورد استفاده شده).

روش تهیه عصاره الکلی گیاه تاتوره:

پس از تهیه بذر گیاه تاتوره، ناخالصیهای بذر جدا شده، آسیا شدند. با نسبت ۱ به ۴ با الكل مтанول ۷۰ درصد به مدت ۲۴ ساعت در محیط آزمایشگاه نگه داشته شده سپس با کاغذهای صافی بزرگ و کوچک عمل عبور از صافی دقیق انجام گرفت. عصاره خالص در حمام بافتی 50°C قرار گرفته تا الكل آن تقریباً به طور کامل تبخر شود. عصاره خشک به صورت پودر در آمده و به وسیله نرمال سالین غلظتهای متفاوت بر حسب میلی گرم به ازای هر کیلو تهیه شد.

آزمونهای بررسی درد:

الف- آزمون با صفحه داغ:

جهت کاهش استرس قرار گرفتن موشهای صحرایی در دستگاه صفحه داغ، قبل از روشن کردن دستگاه با قرار دادن هر موش ۴-۳ مرتبه با فواصل زمانی ۵-۳ دقیقه بر روی صفحه دستگاه سعی می شد که موش را با محیط صفحه آزمون آشنا سازیم. سپس برای آزمون، موشهای بر روی صفحه داغ که بر روی عدد 54°C تنظیم شده بود قرار می گرفتند. فاصله زمانی بین قرار گرفتن موش بر روی دستگاه تا زمان رسیدن پای حیوان به عنوان مدت زمان به آستانه رسیدن درد به وسیله حرارت در نظر گرفته می شد. برای محاسبه دقیقتر اعداد، هر موش ۵-۴ مرتبه با فواصل زمانی ۵ دقیقه بر روی دستگاه قرار گرفته بعد از ۴-۵ ثانیه یک میانگین گرفته می شد. برای جلوگیری از آسیب بافتی آزمون بیشتر از ۳۰ ثانیه به طول نمی انجامید. داده های موشهای گروه کنترل و عصاره گرفته با آزمون Student *t-test* مقایسه و معنی دار بودن اثر عصاره در این آزمون بررسی می شد. همچنین به کمک رابطه (Heidari et al ۱۹۹۶).

$$MPE = \frac{Test\ latency(sec) - Baseline(sec)}{Cut\ Off(sec) - Baseline(sec)} \cdot 100$$

که در آن MPE نشان دهنده حداکثر اثر ممکن (Maximum Possible Effect) و به ترتیب Test latency و Baseline به معنی زمان تأخیر قبل از تزریق عصاره و بعد از تزریق عصاره و Cut off حداکثر زمان مجاز قرار دادن موش بر روی دستگاه (۳۰ ثانیه) می‌باشد، حداکثر اثر عصاره گیاه به‌شکل درصد محاسبه می‌شد.

ب- آزمون با فرمالین:

در این آزمون هم مانند صفحه داغ موشهای صحرایی قبل از آزمون چندین مرتبه درون قفس شفاف (Perpex) جهت آشنایی با محیط قرار می‌گرفتند. پس از عادت کردن موشهای به محیط جدید هنگام آزمون اصلی فرمالین ۲/۵ درصد به مقدار ۵۰ میکرولیتر در کف پای حیوان تزریق و جهت بررسی درد درون قفس قرار می‌گرفتند. در گروه درمان میزان مؤثر عصاره گیاه تاتوره ۲۰-۱۵ دقیقه قبل از آزمون فرمالین به‌صورت داخل صفاقی تزریق می‌شد. با قرار گرفتن حیوان در قفس میزان درد حیوان با اعداد صفر، ۱، ۲ و ۳ رتبه‌بندی می‌گردد. عدد صفر حالت بدون درد، عدد یک عدم توانایی حیوان در تحمل وزن بر روی پای فرمالین گرفته، عدد ۲ حالتی است که موش پای خود را بالا نگه داشته و بر روی زمین قرار نمی‌دهد و حالت ۳ که شدیدترین حالت درد است موش پای فرمالین گرفته را لیسیده یا گاز می‌گیرد. رتبه‌بندی درد حیوانات از زمان تزریق فرمالین تا ۶۰ دقیقه بعد انجام می‌پذیرفت و در هر دقیقه مرحله درد موش مشخص می‌شد (چهار مرحله ۱۵ ثانیه‌ای). البته در تحلیل آماری رتبه‌بندی درد هر ۵ دقیقه به ۵ دقیقه انجام می‌گرفت (Coderre *et al*, ۱۹۹۰).

تحلیل آماری:

در هر میزان از عصاره نتایج بدست آمده از اثر بی‌دردی عصاره به‌صورت میانگین و انحراف معیار ثبت می‌شد. محاسبات آماری برای بررسی ارتباط معنی‌داری بین

گروههای آزمایشی با استفاده از آزمون (ANOVA) و در پی آن آزمون تکمیلی Tukey انجام گرفته و اختلاف با $P < 0.05$ معنی دار در نظر گرفته می شد.

نتایج

تعیین میزان کشنده (LD_{50}) عصاره گیاه تاتوره:

برای این آزمون عصاره الكلی گیاه تاتوره در میزان های ۵۰۰، ۱۰۰۰، ۱۵۰۰، ۲۰۰۰، ۲۵۰۰، ۳۰۰۰ و ۴۰۰۰ میلی گرم به ازای هر کیلو گرم هر کدام در ۹-۱۶ عدد موش مورد بررسی قرار گرفتند. در میزان های ۳۰۰۰ به بالا موش در عرض یک ساعت تلف می شد و میزان های ۵۰۰ و ۱۰۰۰ تلفاتی را به وجود نیاوردند. در میزان ۲۵۰۰ تقریباً نیمی از موشها طی ۲۴ ساعت تلف شده و به عنوان LD_{50} در آزمونهای ما انتخاب گردید (جدول شماره ۱).

تعیین میزان مؤثر (ED_{50}) عصاره گیاه تاتوره در آزمون درد حاصل از فرمالین:

در این آزمون عصاره الكلی گیاه تاتوره در میزان های ۵، ۱۰، ۲۵، ۵۰، ۱۰۰، ۲۰۰ و ۲۵۰ میلی گرم به ازای هر کیلو گرم مورد استفاده قرار گرفت. هر میزان در ۹-۱۲ عدد حیوان بررسی و میزان درد در حیوان در حضور عصاره بررسی گردید. همان طور که در شکل شماره ۱ نشان داده می شود میزان 50 mg/kg عصاره به عنوان میزان مؤثر گیاه در کاهش درد انتخاب گردید.

تعیین میزان مؤثر (ED_{50}) عصاره گیاه تاتوره در آزمون صفحه داع:

در این آزمون هم میزان های ۵، ۱۰، ۲۵، ۵۰ و ۱۰۰ میلی گرم به ازای هر کیلو گرم هر کدام در ۷-۹ عدد موش مورد استفاده قرار گرفت. همان طور که در شکل شماره ۲ نشان داده می شود مؤثر ترین میزان گیاه در این آزمون 25 mg/kg بدست آمد.

بررسی اثر عصاره گیاه تاتوره بر درد حاصل از تزریق فرمالین:

همان طور که در شکل شماره ۱ قسمت الف و ب مشاهده می‌شود میزان‌های متفاوت عصاره گیاه تاتوره توانسته است درد حاد (الف) و التهابی (ب) حاصل از تزریق فرمالین را به میزان معنی‌داری کاهش دهد. بهرغم اثر ناچیز این عصاره در میزان‌های ۵ و ۱۰، میزان‌های ۲۵، ۵۰ و ۱۰۰ با اثر متوسط و میزان 200 mg/kg بهمیزان مشخص و معنی‌داری ($P < 0.001$) درد حاصل از فرمالین را کاهش می‌دهد. در شکل شماره ۳ مقایسه اثر میزان مؤثر عصاره گیاه تاتوره (50 mg/kg) در طی ۶۰ دقیقه نشان داده شده است. همان گونه که شکل نشان می‌دهد عصاره گیاه تاتوره باعث شده است که درد در هر دو مرحله اول و دوم نسبت به گروه کنترل به میزان معنی‌داری کاهش یابد. لازم به ذکر است که با توجه به اینکه هوشیاری و توانایی حرکتی حیوان در طی مراحل آزمایش کاملاً پزشکی می‌باشد، می‌توان نتیجه گرفت که اثر خالص عصاره بر درد اعمال شده است. مقایسه درد حاد و مزمن در شکل شماره (۱) قسمت الف و ب نشان می‌دهد که اگرچه حداقل میزان مؤثر عصاره در کاهش درد مزمن کمتر از حداقل میزان آن در کاهش درد حاد است (۱۰ نسبت به ۲۵) اما به‌طور کلی الگو و روند کاهش درد در هر دو نوع درد حاد و مزمن به شکل وابسته به میزان عمل می‌کند.

بررسی عصاره گیاه تاتوره بر درد حاد حاصل از صفحه داغ:

در شکل شماره ۴ اثر میزان‌های متفاوت عصاره گیاه تاتوره طی آزمون درد با صفحه داغ نشان داده شده است. استفاده از میزان ۵ میلی‌گرم به ازای هر کیلوگرم اثر خاصی بر درد حاصل از صفحه داغ ایجاد نمی‌کند. ولی توانایی کاهش میزان درد حاد به‌طور بارز در میزان‌های ۵۰ و ۱۰۰ میلی‌گرم به ازای هر کیلوگرم به خوبی مشخص است. میزان‌های متوسط ۱۰ و ۲۵ میلی‌گرم به ازای هر کیلوگرم توانسته‌اند به میزان کمتر، ولی معنی‌داری ($P < 0.05$) درد حاد حاصل از صفحه داغ را کاهش دهند.

بحث

وجود درد به عنوان یکی از مشکلات بالینی بیماران و همچنین تنوع عوامل بروز درد که روش‌های جدید و متنوع درمان را طلب می‌کند، به یک گستره تحقیقاتی پیچیده در این زمینه منجر شده است (Andrew *et al*, ۱۹۹۶). به رغم وجود روش‌های متنوع تسکین و درمان درد که به صورت شایع مورد استفاده است هنوز محققان به دنبال روش‌های جدید و بهتر درمان این پدیده فیزیولوژیکی می‌باشند. با وجود داروسازی پیشرفته و داروهای شیمیایی فراوان در جهت تسکین درد، مشکل عدم توانایی موفق درمان و اثرات جانبی گستردۀ آن گریبانگیر بیماران می‌باشد (Murray *et al*, ۱۹۹۳). از این رو استفاده از داروهای گیاهی به دلیل مقرنون به صرفه بودن و همچنین اثرات جانبی کمتر و از طرفی قابلیت دسترسی آسانتر توصیه می‌شود (Attiso, ۱۹۷۹).

گیاه تاتوره به عنوان یکی از گیاهان ضد درد مؤثر دارای ترکیب‌های خاص آلکالوئیدی می‌باشد که مهمترین آنها ترکیب‌های آنتی‌موسکارینی می‌باشند (عقیلی خراسانی، ۱۳۷۱). استفاده از این گیاه به عنوان تخدیر کننده و توهمند زا در بسیاری از جوامع متداول می‌باشد (Schulman *et al*, ۱۹۹۸). اگرچه اثرات جانبی خاصی مانند افزایش فعالیت ترشحی دستگاه گوارش، خشکی دهان و بالا رفتن دم و بازدم و فشار خون از عوارض جانبی در مصرف کنندگان این گیاه گزارش شده است (Hasan *et al*, ۱۹۸۷)، اما بروز علائم تخدیری و توهمندی این گیاه با توجه به نوع ترکیب‌های آلکالوئیدی در این گیاه (Piva *et al*, ۱۹۹۵). نکته مهمی را در ذهن ایجاد می‌کند. این مطلب اگرچه موضوع اصلی تحقیق ما نیست، اما با توجه به تقویت اثر اوپیوئیدها توسط آلکالوئیدهای گیاه تاتوره قابل توجیه می‌باشد. در مطالعه حاضر چه در آزمون با فرمالین چه در داده‌های بدست آمده از آزمایش‌های صفحه داغ بی‌دردی معنی‌داری به وجود آمد. با توجه به نوع آزمون فرمالین که جهت سنجش هر دو نوع درد حاد و مزمن مورد استفاده می‌گیرد، می‌توان نتیجه گرفت که عصاره گیاه تاتوره توانسته است که هر دو نوع درد حاد و

مزمن حاصل از تزریق فرمالین را کاهش دهد. به رغم اثر میزان‌های پایین‌تر عصاره گیاه تاتوره در ایجاد بی‌دردی در مرحله مزمن نسبت به مرحله درد حاد، به‌طور کلی هر دو نوع درد تقریباً به یک نسبت کاهش یافته‌اند. مقایسه اثر کاهش درد حاد (مرحله یک) ناشی از صفحه داغ با کاهش درد حاد فرمالینی تقریباً در یک راستا بوده و با توجه به اینکه ایجاد دردهای مرحله یک مانند صفحه داغ یا بازتاب عقب کشیدن دم بیشتر از طریق سازوکار مرکزی عمل می‌کنند (Shibata *et al*, ۱۹۸۹)، بنابراین نتایج کاهش درد در آزمون صفحه داغ و مرحله حاد فرمالینی تأییدی بر عملکرد عصاره از طریق سازوکار مرکزی می‌باشد. تأثیر عصاره گیاه تاتوره بر مرحله دوم یا التهابی درد فرمالینی می‌تواند نشان دهنده سازوکار احتمالی عصاره گیاه از طریق تعديل واسطه‌های محیطی باشد. اما با توجه به اینکه کاهش مرحله دوم درد (التهابی) به دنبال مهار مرحله اول (حاد) فرمالینی هم گزارش شده است (Tjolsen *et al*, ۱۹۹۲)، بنابراین احتمالاً تأثیر عصاره در مرحله التهابی درد به شکل مستقیم با تعديل واسطه‌های موضعی درد یا به‌شكل غیر مستقیم به دنبال کاهش درد حاد ایجاد می‌گردد. در مورد سازوکار احتمالی اثر عصاره تاتوره با توجه به آزمایشات دیگران که نشان دادند نالوکسان به عنوان یک آنتاگونیست اوپیوئیدی قادر به جلوگیری از اثر ضددردی گونه‌های خاصی از گیاه تاتوره می‌باشد (Abena *et al*, ۲۰۰۳)، همچنین با توجه به تقویت اثر ضد دردی مرفین توسط آنتاگونیستهای کولینرژیکی (Thor *et al*, ۲۰۰۰) و اینکه این تداخل عمل در سطح CNS بر روی مسیرهای ورودی درد صورت می‌گیرد (Behbehani, ۱۹۸۲) می‌توان نتیجه گرفت که احتمالاً ترکیب‌های آلکالوئیدی گیاه تاتوره با تداخل با سیستم اوپیوئیدی در کاهش درد عمل کند. به این ترتیب مهار دردهای حاد فرمالینی و صفحه داغ از طریق سازوکار مرکزی قابل توجیه می‌باشد. در مورد درد التهابی یا مزمن فرمالینی به رغم اینکه از طریق سازوکارهای محیطی صورت می‌گیرند، اما با توجه به اینکه مهار درد حاد یا مرحله اول که سازوکار مرکزی دارد قادر است درد محیطی

(مزمن) را تخفیف دهد (Tjolsen *et al*, ۱۹۹۲)، بنابراین می‌توان مهار مرکزی درد حاد را دلیلی برای کاهش درد مزمن دانست.

در نهایت از تحقیق حاضرچنین نتیجه‌گیری می‌شود که در آزمونهای درد با فرمالین و صفحه داغ، عصاره الکلی بذر گیاه تاتوره قادر به کاهش میزان درد به صورت بارزی می‌باشد که احتمالاً این اثر ضد دردی از طریق ترکیب‌های آکالوئیدی این گیاه و تداخل آن با سیستم اوپیوئیدی از طریق مرکزی در کاهش درد باشد. بررسی جزیی‌تر این موضوع به تحقیقات بیشتر در ارتباط با تداخل دو سیستم اوپیوئیدی و کولینزیکی و اجزاء تشکیل‌دهنده گیاه تاتوره نیاز دارد.


جدول شماره ۱- درصد مرگ و میر موشهای صحرایی در میزان‌های متفاوت عصاره الکلی گیاه تاتوره

n	درصد مرگ و میر موشهای صحرایی	میزان عصاره بر حسب میلی‌گرم به ازای هر کیلوگرم
۱۰	صفر	۵۰۰
۱۲	صفر	۱۰۰۰
۱۲	%۱۰	۱۵۰۰
۱۴	%۳۵	۲۰۰۰
۱۶	%۵۵	۲۵۰۰
۹	%۹۰	۳۰۰۰
۹	%۱۰۰	۴۰۰۰


همانطور که جدول نشان می‌دهد در میزان‌های ۵۰۰ و ۱۰۰۰ میلی‌گرم به ازای هر کیلو گرم تمام موشهای عصاره گرفته زنده ماندند. در میزان‌های ۳۰۰۰ و ۴۰۰۰ تقریباً همه موشها طی ۱ تا ۲ ساعت بعد از تزریق تلف می‌شوند. در میزان‌های ۲۰۰۰ و ۳۰۰۰ بترتیب حدود ۳۵ و ۵۵ در موشها تلف می‌شوند. به این ترتیب مطابق با داده‌های جدول، میزان ۲۵۰۰ میزان موثر کشنده عصاره گیاه تاتوره در نظر گرفته می‌شود.

منابع مورد استفاده


- خراسانی، ع.، ۱۳۷۱ مخزن الادویه ۳۲۴-۳۲۵، انتشارات آموزش انقلاب اسلامی.
- Abena AA., Miguel LM., Mouanga A., Hondi Assah T., 2003. Evaluation of analgesic effect of *Datura Fastuosa* leaves and seed extracts. *Fitoterapia* 74(5): 486-488.
 - Andrew A, Chevallier MN., 1996. The encyclopedia of medicinal plant. London dorling Kindersley book, 171.
 - Attiso MA., 1979. Medicinal plant make a comeback. *Unesco Cour.* (7): 7-8.
 - Behbehani MM., 1982. The role of acetylcholine in the function of the nucleus raphe magnus and in the interaction if this nucleus with the periaqueductal gray. *Brain Res.*, (252) 299-307.
 - Coderre TJ., Grimes W., Melzack R., 1990. Central nervous system plasticity in the tonic pain response to subcutaneus formalin injection. *Brain Res* (535) 155-158.
 - Hasan SS., Kushwaha Ak., 1987. Chronic effect of datura (seed) extract on the brain of albino rats. *Jpn J Pharmacol* (44) 1-6.
 - Heidari M.R., Khalili M., Hashemi B., Zarrindast M.R., 1996. Effect of picritoxine on antinociception in the formalin test. *Pharmacol and Toxicol.* (78) 313-316.
 - Lewis JW., Cannon JT., Liebeskind JC., 1983. Involvement of central muscarinic cholinergic mechanisms in opiate stress analgesia. *Brain Res.* (270) 289-93.
 - Murray MD., Brater DC., 1993. Renalotoxicity of the nonsteroidal anti inflammatory drugs. *Annu. Rev. Pharmacol. Toxicol.*, (33) 435-465.
 - Pert A., Maxey G., 1975. Asymmetrical cross-tolerance between morphine and scopolamine induced antinociception in the primate: differential sites of action. *Psychopharmacologia*, (44) 139-45.
 - Piva G., Piva A., 1995. Anti-nutritional factors of Datura in feedstuffs. *Plant toxin* (4) 238-41.
 - Schulman ML., Bolton LA., 1998. Datura seed intoxicification in two horses. *J SAfr Vet Assoc.* 69 (1): 27-9.
 - Shibata M., Ohkubo T., Takahashi H., Inoki R., 1989. Modified formalin test: characteristic biphasic pain response. *Pain* (38) 347-352.
 - Thor KB., Muhlhuaser MA., Sauerberg P., 2000. Central muscarinic inhibition of lower urinary tract nociception. *Pain* (870) 124-34.
 - Tjolsen A., Berge O.G., Hunskaar S., Rosland J., H., Hole K., 1992. The formalin test: an evaluation of the method. *Pain* (51) 5-17.
 - Young P., Nurs mirror (NM) goes to China 4. 1977 Nurs Mirror 145 (25) 6-8.




شکل شماره ۱- الف) اثر میزانهای ۵، ۱۰، ۵۰، ۲۵، ۱۰۰، ۲۰۰ و ۲۵۰ میلی گرم به ازای هر کیلو گرم عصاره الکلی گیاه تاتوره بر درد حاد حاصل از تزریق فرمالین، همان‌طور که مشاهده می‌شود اثر تاتوره از میزان ۲۵ میلی گرم به ازای هر کیلو گرم شروع و با افزایش میزان به مقدار ۲۵۰ میلی گرم به ازای هر کیلو گرم به شکل وابسته به میزان مقدار درد کاهش می‌یابد. ب) اثر میزانهای افزایشی تاتوره مذکور بر درد التهابی ناشی از تزریق فرمالین، همان‌گونه که مشاهده می‌شود مقدار درد وابسته به میزان کاهش یافته است.



شکل شماره ۲- منحنی اثر غلظتهاي ۵، ۱۰، ۲۵، ۵۰ و ۱۰۰ میلی‌گرم به ازای هر کیلوگرم عصاره گیاه تاتوره بر درد حاد ناشی از صفحه داغ. همان‌طور که مشاهده می‌شود میزان ۲۵ میلی‌گرم به ازای هر کیلوگرم میزان موثره گیاه در این آزمون می‌باشد.



شکل شماره ۳- مقایسه منحنی درد حاد و کرونیک گروه کنترل و عصاره گرفته (میزان مؤثر ۵۰ mg/kg) در آزمون فرمالین. همان‌طور که مشاهده می‌شود هر دو مرحله حاد (زمان ۱۵-۵ دقیقه بعد از تزریق فرمالین) و مزمن درد (زمان ۱۵-۶۰ دقیقه بعد از تزریق فرمالین) به شکل معنی‌داری به وسیله میزان مؤثر گیاه تاتوره کاهش یافته است.



میزان (میلی گرم به ازای هر کیلو گرم)

شکل شماره ۴- مقایسه میزان درد حاد ناشی از صفحه داغ در گروههای کنترل و گروههای عصاره گرفته با غلظتهاي افرايشي ۵ الى ۱۰۰ ميلى گرم به ازاي هر كيلو گرم. همان طوركه مشاهده مي شود عصاره گياه تقربياً وابسته به ميزان قادر به کاهش ميزان درد شده است.

Vol. 20 No. (3), 309-322 (2004)

Evaluation of analgesic effect of *Datura Stramonium* seed extract in hot plate and formalin tested on male rats

M. Khalili Najafabadi¹ and S. M. Atyabi¹

Abstract

The medicinal plant *Datura stramonium* (D.s) is a rich source of alkaloids which has been introduced as an analgesic herb. Regarding the possible interaction between opioid and muscarinic systems and the key role of opioid receptors in alleviation of pain, we investigated the effect of alcoholic *Datura* seed extract in acute and chronic pain. In the present study in order to producing acute and chronic pain, hot plate and formalin tests were used. In treatment group 20 min prior to pain scoring the extract was intraperitonealy administered to the animals and the results was compaired with the control group. In our experiments, the extract alleviated the pain dose dependently, and ED₅₀ was equal to 25 and 50 mg/kg in hot plate and formalin tests, respectively. Analysis of the data by student *t*-test have shown that the acute and chronic pain producing by formalin and hot plate tests were significantly attenuated in animals which treated with D.s seed extract. In order to determine the LD₅₀, doses of 500-4000 mg/kg i.p. of the extract were applied to the animals. In this experiment the calculated LD₅₀ was 2500 mg/kg.

In addition, our results show that the D.s seed extract has an analgesic effect in both acute and chronic pain which were produced by hot plate and formalin tests. It is likely that, this effect can be attributed to the D.s extract alkaloids which interacted with opioid system. Also, regarding the significant difference between ED₅₀ and LD₅₀, perhaps we can introduce the D.s seed extract as an analgesic medicinal plant.

Key words: Pain, *Datura stramonium*, Formalin and hot plate tests

1- Associated Prof in Physiology (Ph.D), Dept of Physiology, Medicine School, Shahed University. Email: najafabady@yahoo.com.

فرم اشتراک فصلنامه پژوهشی تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران

جهت اشتراک کافی است فرم اشتراک زیر را تکمیل و به همراه فتوکپی فیش بانکی حق اشتراک قابل واریز در کلیه شعب (همنم) در ایران، به شماره حساب جاری ۱۴۳۴ نزد بانک مرکزی وجوه درآمد مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع شعبه خزانه واریز نمایید و به نشانی دفتر مجله در تهران ارسال دارید.

نام و نام خانوادگی:
مدت اشتراک: تاریخ شروع اشتراک:
تلفن: شغل: میزان تحصیلات:
نشانی:
کد پستی: صندوق پستی:
توضیحات:

امضا،

حق اشتراک یکساله ۷۲۰۰۰ ریال

تهران، کیلومتر ۵ آزاد راه تهران - کرج، خروجی پیکانشهر، انتهای خیابان ۲۰ متری دوم،
بلوار مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع
مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع

تهران، صندوق پستی: ۱۳۱۸۵-۱۱۶ پست الکترونیکی: ijmapr@rifr-ac.ir

تلفن: ۰۱۹۵۹۰۱-۵ نمابر: ۰۱۹۵۹۰۷

A -----

In the Name of God

Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants Research

Director in chief: Adel Jalili
(Ph.D., Research Institute of Forests and Rangelands)

Chief editor: Mohammad Bagher Rezaee
(Ph.D., Research Institute of Forests and Rangelands)

Editorial Board:

Parviz Babakhanloo M.S.C., Research Institute of Forests and Rangelands	Mahlagha Ghorbanli Ph.D., Tarbiat Moallem University
Nader Hassanzadeh Ph.D., Research Institute and Disease	Hossein Heidari Sharif Abad Ph.D., Research Institute of Forests and Rangelands
Kamkar Jaimand Ph.D., Research Institute of Forests and Rangelands	Mohsen Kafee Ph.D., Faculty Agriculture, University of Tehran
Abolghassem Matin Ph.d. Agricultural Research Education and Extension Organization	Fariborz Moatar Ph.D., Faculty of Pharmacy, University of Medical Scince, Isfahan
Mohammad Javad Rassaei Ph.D., Tarbiat Modares University	Iraj Rasooli Ph.D., Shahed University
Gholam Reza Nabi Ph.D., University of Tehran	Parviz Owlia Ph.D., Shahed University
Mohammad Bagher Rezaee Ph.d. Research Institute of Forests and Rangelands	Peyman Salehi Ph.D., Shahid Beheshti University
Fatemeh Sefidkon Ph.d. Research Institute of Forests and Rangelands	Mohammad Reza Shams Ardecani Ph.D., Faculty of Pharmacy, University of Medical Scince, Tehran
Abbas Siami Ph.D., University of Urmia	Reza Tabaei Aghdaii Ph.d. Research Institute of Forests and Rangelands

Technical editor: Kamkar Jaimand
(Ph.D., Research Institute of Forests and Rangelands)

Editorial office:

Research Institute of Forests and Rangelands
P.O. Box 13185-116, Tehran, Iran.
Tel: 4195901-5 Fax: 4195907
Email: ijmapr@rifr.ac.ir

*Abstracts are available on CABI Publishing:
[www.cabi - Publishing. org](http://www.cabi-publishing.org)*



Islamic Republic of Iran
Ministry of Jihad-e-Agriculture
Agricultural Research and Education Organization
Research Institute of Forests and Rangelands

Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants

Vol. 20 No.(3), 2004

Content

Growth indices of some medicinal plants under different water stresses	395
M.H. Lebaschi and E. Sharifi Ashoorabadi	
Research on the changes of metabolism in response to water stress in <i>Satureja hortensis</i> L.....	394
Z. Baher Nik, M. B. Rezaee, M. Ghorbanli, F. Asgari and M. K. Araghi	
Study on antimicrobial effects of essential oil of <i>Zhumeria majdae</i> Rech. f. & Wendelbo.....	393
M. A. Soltani poor, M. B. Rezaee and A. Moradshahi	
Comparative study on inorganic elements of different genotypes of <i>Rosa damascena</i> Mill from different provinces of Iran	392
M. B. Rezaee, M. Naderi Hagy Bagher Candy and S.R.Tabaei Aghdai	
Evaluation and the study of germination potential, speed of germination and vigor index of the seeds of two species of medicinal plants (<i>Eruca sativa</i> Lam., <i>Anthemis altissima</i> L.) under cold room and dry storage condition.....	391
M. A. Alizadeh and H. R. Isvand	
Evaluation of analgesic effect of <i>Datura Stramonium</i> seed extract in hot plate and formalin tested on male rats.....	390
M. Khalili Najafabadi and S. M. Atyabi	
Determination of Juglone from Leaves and fresh peels of <i>Juglans regia</i> L. by High Performance Liquid Chromatography	389
K. Jaimand, P. Baghai, M. B. Rezaee, S. A. Sajadipoor and M. Nasrabadi	
Study of flower yield variation in <i>Rosa damascena</i> Mill. from Western regions of Iran	388
S. R. Tabaei-Aghdai and M. B. Rezaee	
Medicinal plants of Zanjan province.....	387
A. Mousavi	
Effects of nitrogen application methods on yield of <i>Melissa (Melissa officinalis)</i>	386
E. Sharifi Ashoorabadi, A. Matin, M. H. Lebaschi and B. Abbaszadeh	
Primory Phytochemical investigation of <i>Echium amoenum</i>	385
M. Naderi Hagy Bagher Candy and M. B. Rezaee	