

مقایسه اثر شش عصاره گیاهی و آنتی بیوتیک ویرجینیامايسین بر سیستم ایمنی و لیپیدهای سرم جوجه‌های گوشته

بهنام کریمی^۱، شعبان رحیمی^{۲*} و محمدامیر کریمی ترشیزی^۳

۱- دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه پرورش و مدیریت تولید طیور، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس تهران

۲- نویسنده مسئول، استاد، گروه پرورش و مدیریت تولید طیور، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس تهران

پست الکترونیک: rahimi_s@modares.ac.ir

۳- استادیار، گروه پرورش و مدیریت تولید طیور، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس تهران

تاریخ پذیرش: تیر ۱۳۹۲

تاریخ اصلاح نهایی: تیر ۱۳۹۲

تاریخ دریافت: بهمن ۱۳۹۱

چکیده

این مطالعه بهمنظور بررسی اثر گیاهان دارویی بر سیستم ایمنی و لیپیدهای سرم جوجه‌های گوشته انجام شد. در این آزمایش ۴۸۰ قطعه جوجه خروس یک روزه راس ۳۰۸ به طور تصادفی به ۸ گروه آزمایشی هر کدام با ۳ تکرار و ۲۰ پرنده در هر تکرار اختصاص داده شدند. جیره پایه (ذرت و سویا) با ۱۵ppm ویرجینیامايسین (Virginiamycin) و هر کدام از عصاره‌های گیاهی اکالیپتوس داده شدند. سیر (Allium sativum L.), بونی (Bunium persicum (Boiss.) B. Fedtsch.) و شیرین‌بیان (Achillea millefolium L.)، بومادران (Matricaria chamomilla L.)، بابونه آلمانی (Eucalyptus globulus L.)، زیره سیاه ایرانی (Glycyrrhiza glabra L.) و سیر (Spiraea salicifolia L.) به میزان ۰/۰٪ در آب آشامیدنی مورد استفاده قرار گرفت. در روز ۴۱ پرورش جوجه‌های گوشته از هر واحد آزمایشی ۳ قطعه پرنده انتخاب شده و از آنها برای اندازه‌گیری کلسترول، تری‌گلیسرید، LDL و HDL سرم، خون‌گیری بعمل آمد. واکسن نیوکاسل نوبت دوم (لاسوتا) در سن ۲۳ روزگی از طریق آب آشامیدنی به جوجه‌ها داده شد و در روزهای ۳۴ و ۴۱ روزگی خون‌گیری برای تعیین تیتر نیوکاسل انجام شد. بالاترین تیتر آنتی‌بادی علیه پادتن نیوکاسل در گروه مصرف‌کننده بابونه مشاهده شد ($p < 0.05$). بالاترین تیتر آنتی‌بادی علیه پادتن گلبلول قرمز گوسفند در گروه مصرف‌کننده اکالیپتوس مشاهده گردید ($p < 0.05$) و بالاترین میزان تری‌گلیسرید سرم در ۴۲ روزگی در گروه ویرجینیامايسین مشاهده شد که تفاوت معنی‌داری با گروه شاهد نداشت ($p < 0.05$). پایین‌ترین سطح کلسترول سرم در گروه مصرف‌کننده سیر دیده شد ($p < 0.05$) و کمترین سطح LDL در گروه مصرف‌کننده اکالیپتوس مشاهده گردید ($p < 0.05$).

واژه‌های کلیدی: جوجه‌های گوشته، عصاره گیاهی، ویرجینیامايسین، سیستم ایمنی.

مقدمه

داروهای گیاهی و عصاره آنها و مواد ضد میکروبی طبیعی را بیشتر نموده است (Jukic & Molis, 2005). علاوه بر این، در صنعت طیور افزایش عملکرد سیستم ایمنی برای مقابله با بیماریهای عفونی بسیار حائز اهمیت است. عوامل مختلفی از

افزایش روزافزون مقاومت به آنتی بیوتیک‌ها و عوارض جانبی آنها و استفاده بیش از حد از نگهدارنده‌های شیمیایی مواد غذایی که بعضی مشکوک به سرطان‌زاگی هستند توجه به

در آزمایشی از آنتیبیوتیک ویرجینیامايسین، پروپیوتیک پریمالاک و بومادران در تغذیه جوجه‌های گوشتی استفاده شد. استفاده از این مواد تأثیری روی عملکرد و بازده لашه به طور معنی‌داری نداشت. در مطالعه مزبور استفاده از بومادران باعث کاهش تری‌گلیسرید و کلسترول شد. بالاترین تیتر آنتیبادی نیز در تیمار بومادران و کمترین آن در گروه آنتیبیوتیک مشاهده گردید (Yakhkeshi *et al.*, 2010). در آزمایشی از زیره سیاه به همراه پودر یونجه در جیره بلدچین ژاپنی استفاده شد. استفاده از این تیمارها باعث بهبود عملکرد و کاهش کلسترول و تری‌گلیسرید در سرم شد (Hosseini Mansoub & Pooryousef, 2012). در جوجه‌های گوشتی تغذیه شده با مکمل پودر سیر کاهش کلسترول مشاهده شد که این کاهش به دلیل کاهش فعالیت آنزیم ۳-هیدروکسی-۳-متیل گلوتاریل کوازنزیم آ رودکتاز و ۷-آلfa-هیدروکسیلاز بود (Konjufca *et al.*, 1997). در مطالعه‌ای سیر غلظت تام کلسترول-LDL، تری‌گلیسرید و کلسترول را به طور معنی‌داری کاهش داد، اما افزایش غلظت HDL معنی‌دار نبود (Warshafsky *et al.*, 1993) و همکاران (Sedghi *et al.*, 1993) از پروپیوتیک و سطوح مختلف شیرین‌بیان (۰/۵٪، ۱٪ و ۲ گرم/کیلوگرم) در مرغ گوشتی استفاده کردند. پرندگانی که از شیرین‌بیان استفاده کرده بودند چربی حفره بطی کمتری داشتند و همچنین سطح کلسترول در سرم کاهش یافته بود. سطح گلوکر، تری‌گلیسرید، VLDL و HDL تغییری را نشان نداد، در حالی‌که کلسترول و LDL کاهش یافتند که می‌تواند در نتیجه فعالیت شیرین‌بیان در حفاظت کلسترول LDL در برابر اکسیداسیون، بازدارندگی از فعالیت گلیکوژناناز و لیپوکسیژناز و بازدارندگی از پراکسیداسیون چربی‌ها باشد (Craig, 1999). تعداد گلبول سفید در مقایسه با تیمار شاهد و پروپیوتیک افزایش نشان دادند. در این تحقیق فرض بر این است که گیاهان دارویی مورد استفاده در بهبود سیستم ایمنی و فاکتورهای خونی جوجه‌های گوشتی تأثیر گذارند و می‌توان از آنها به عنوان جایگزین مناسبی برای آنتیبیوتیک‌های محرك رشد استفاده کرد.

قبيل شکست واکسیناسیون، بیماریهای عفونی کاهنده سیستم ایمنی و استفاده نامتعارف از آنتیبیوتیک‌ها، باعث کاهش پاسخ ایمنی می‌شود (Chen *et al.*, 2003). گیاهان دارویی و فراورده‌های آنها می‌توانند باعث افزایش بهبود رشد در دام و طیور شوند. گزارش شده‌است که گیاهان دارویی و ترکیب‌های مؤثر موجود در آنها سبب توسعه جمعیت میکروبی مفید (باکتری‌های اسید لاکتیک) و مهار میکروب‌های بیماری‌زا و غیرمفید در دستگاه گوارش شده و موجب افزایش طول پرزهای روده و بهبود عملکرد در جوجه‌های گوشتی می‌گردد (Yakhkeshi *et al.*, 2010). گزارش شده‌است که گیاهان دارویی با بهبود تعادل میکروبی، باعث کاهش جمعیت اشریشیاکلی و کلستریدیوم و تحریک تکثیر لاکتوباسیلوس و حفاظت لایه پرزهای روده می‌شوند (Jamroze *et al.*, 2004). همچنین کاهش ویسکوزیته مواد هضمی (Francesch *et al.*, 1999)، کاهش کلسترول و تری‌گلیسرید خون (Yalçın *et al.*, 2006) و خاصیت آنتیاکسیدانی (Farag *et al.*, 1989) از دیگر خواص گیاهان دارویی می‌باشد.

در مطالعه‌ای Hassan و همکارانش (۲۰۱۱) اکالیپتوس را در سطح ۰/۵٪ و ۰/۰٪ جیره بر روی بلدچین ژاپنی مورد ارزیابی قرار دادند و مشاهده کردند که سطح کلسترول کبد، LDL و چربی کل در مقایسه با گروه کنترل کاهش یافت. همچنین تیتر آنتیبادی تولید شده علیه بیماری نیوکاسل و آلفلوازای مرغی تولید شده در گروه تغذیه شده با اکالیپتوس و آلفلوازای مرغی تولید شده در گروه تغذیه شده با اکالیپتوس افزایش یافته بود. مصرف باونه به دلیل خاصیت آنتی‌هاپرگلیسمی می‌تواند از افزایش قند خون جلوگیری نماید. همچنین به خوبی خاصیت آنتی‌پاتوزنی باونه توسط Shikov و همکاران (۲۰۰۸) گزارش شده است که مشاهده کردند استفاده از روغن استخراج شده از باونه اثر بازدارندگی روی باکتری هلیکوباکتر بیلوری دارد. افزایش وزن ممکن است به دلیل کاهش استرس با مصرف باونه باشد، زیرا نشان داده شده که باونه خاصیت ضداسترس دارد و محدودیت تولید کورتیزول توسط Reis و همکاران (۲۰۰۶) گزارش شده است.

Maceration (خیساندن) به نسبت ۱ به ۵ (یک قسمت اندام مورد نظر پنج قسمت حلال) استفاده شد (Zhang et al., 2005). ترکیب غذایی جیره پایه در جدول ۱ آورده شده است. در روزهای ۱۴ و ۳۴ به سه قطعه پرنده از هر قفس مقدار ۰/۰ میلی لیتر از سوسپانسیون گلbul قرمز گوسفند ۰/۵٪ شسته شده در بافر فسفات استریل، از طریق عضله سینه تزریق گردید. هفت روز پس از هر بار تزریق گلbul قرمز (روزهای ۲۱ و ۴۱)، از همان پرندها از طریق ورید بال خون‌گیری انجام شد. در روز ۴۱ پرورش جوجه‌های گوشتی از هر واحد آزمایشی ۳ قطعه پرنده انتخاب شده و از آنها برای اندازه‌گیری کلسترول، تری‌گلیسرید، LDL و HDL سرم از طریق ورید بال، خون‌گیری بعمل آمد. واکسن نیوکاسل (لاسوتا) در سن ۲۳ روزگی از طریق آب آشامیدنی به جوجه‌ها داده شد و در روزهای ۳۴ و ۴۱ روزگی خون‌گیری انجام شد. نتایج حاصل در قالب طرح کاملاً تصادفی با استفاده از نرمافزار SAS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و مقایسه میانگین داده‌ها با استفاده از آزمون دانکن در سطح آماری ۵٪ انجام گردید.

مواد و روشها

این آزمایش در سالن مرغداری دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس انجام شد. تعداد ۴۸۰ قطعه جوجه خروس یک روزه گوشتی سویه راس ۳۰۸ (Ross 308) تهیه گردید. جوجه‌ها در قالب طرح کاملاً تصادفی، با هشت گروه آزمایشی و هر گروه با سه تکرار و در هر واحد آزمایشی ۲۰ جوجه مورد بررسی قرار گرفتند. گروه‌های آزمایشی شامل عصاره حبه سیر، عصاره گل بابونه آلمانی، عصاره گل زیره سیاه ایرانی، عصاره گل بابونه آلمانی، عصاره گل بومادران، عصاره برگ اکالیپتوس و آنتی‌بیوتیک (Allium sativum L.) ویرجینیامايسین و شاهد بودند. سیر (Glycyrrhiza glabra L.)، زیره سیاه ایرانی (Matricaria persicum), بابونه آلمانی (Bunium persicum), (Achillea millefolium L.), بومادران (chamomilla Eucalyptus globulus L.) هر کدام ۰/۱٪ و آنتی‌بیوتیک ویرجینیامايسین (Virginiamycin) ۱۵ ppm در جیره غذایی استفاده شدند. عصاره‌ها به صورت محلول در آب آشامیدنی بودند، برای عصاره‌گیری از روش استاندارد

جدول ۱- اجزای جیره پایه مورد استفاده در آزمایش

ذرت	مواد خوراکی	جیره آغازین (۱-۱۰ روزگی)	جیره رشد (۱۱-۳۵ روزگی)	جیره پایانی (۳۶-۴۲ روزگی)
برحسب درصد	برحسب درصد	برحسب درصد	برحسب درصد	برحسب درصد
کنجاله سویا	مکمل معدنی-ویتامینی ۵٪	۰/۱	۵۹	۶۱/۵
پودر ماهی	متیونین	۲/۷	۳۲	۳۰
دی کلسیم فسفات	لیزین	۲/۵	۲/۵	۲
صفد	روغن سویا یا اسید چرب	۱/۶	۱/۴	۱/۱
میکرونز	نمک	۱/۳	۱/۲	۱/۱
لیزین		۰/۶	۰/۶	۰/۶
		۰/۲	۰/۱	۰/۱
		۱	۱/۵	۱/۵
		۰/۲	۰/۲	۰/۲

ویرجینیامايسین مشاهده شد که تفاوت معنی داری با گروه شاهد نداشت. روند کاهش مقدار تری گلیسرید در گروه های مصرف کننده گیاهان دارویی مشاهده شد. بالاترین سطح کلسترول بین تیمارها در گروه شاهد دیده شد که تفاوت معنی داری با سایر تیمارها غیر از گروه مصرف کننده سیر نداشت. پایین ترین سطح کلسترول سرم در گروه مصرف کننده سیر و بالاترین سطح LDL (کلسترول بد) در گروه مصرف کننده بابونه و شاهد مشاهده شد که تفاوت معنی داری با سایر تیمارها غیر از اکالیپتوس نداشت. کمترین سطح LDL در گروه مصرف کننده اکالیپتوس مشاهده شد. در مورد HDL (کلسترول خوب) مشاهده می شود که استفاده از گیاهان دارویی باعث افزایش سطح آن در سرم شده است. پایین ترین سطح آن در گروه های مصرف کننده آنتی بیوتیک، شاهد و بومادران مشاهده شد. بالاترین سطح آن در گروه استفاده کننده اکالیپتوس مشاهده شد.

نتایج

جدول ۲ تأثیر گیاهان دارویی و آنتی بیوتیک بر سیستم ایمنی را نشان می دهد. در مورد عیار پادتن نیوکاسل نیز در ۲۸ روزگی تفاوتی بین گروه های مختلف مشاهده نمی شود، اما در ۴۲ روزگی تفاوت معنی دار بین گروه های مختلف مشاهده می شود. بالاترین تیتر آنتی بادی در گروه مصرف کننده بابونه مشاهده می شود که تفاوت معنی داری با سایر گروه ها غیر از زیره سیاه و بومادران نداشت. بررسی SRBC سیستم ایمنی هومورال با استفاده از تست نشان دهنده این مطلب است که در نوبت اول تفاوت معنی داری بین تیمارهای مختلف وجود ندارد. اما در نوبت دوم کمترین تیتر آنتی بادی در گروه بومادران مشاهده می شود که تفاوت معنی دار با سایر گروه ها دارد ($p < 0.05$). بالاترین تیتر آنتی بادی در گروه مصرف کننده اکالیپتوس مشاهده می شود ($p < 0.05$).

همان طور که در جدول ۳ مشاهده می کنیم بالاترین میزان تری گلیسرید سرم در ۴۲ روزگی در گروه

جدول ۲- تأثیر عصاره های گیاهی و آنتی بیوتیک بر سیستم ایمنی جوجه های گوشته

نوع تیمار	نوبت اول ۲۸ روزگی	نوبت دوم ۴۲ روزگی	نوبت اول ۲۸ روزگی	نوبت دوم ۴۲ روزگی	عيار پادتن عليه گلبول قرمز گوسفند (log)	عيار پادتن عليه ویروس واکسن نیوکاسل (لاسوتا (log)
شاهد	۳۳/۴	۳۳/۵ ab	۴	۶ ab	۶۶/۴ ab	۳۳/۶ a
بابونه	۴	۶ ab	۶۶/۳	۶ ab	۳۳/۶ a	۳۳/۴ b
بومادران	۶۶/۵	۳۳/۴ b	۴	۳۳/۴ b	۳۳/۴ b	۳۳/۵ ab
اکالیپتوس	۵	۶/۶۶ a	۶۶/۵	۳۳/۶ ab	۵ ab	۵ ab
شیرین بیان	۶۶/۳	۳۳/۶ ab	۵	۳۳/۶ ab	۳۳/۳	۳۳/۳
سیر	۳۳/۵	۳۳/۵ ab	۳۳/۵	۳۳/۵ ab	۳۳/۲	۳۳/۲
زیره سیاه	۳۳/۴	۳۳/۵ ab	۳۳/۴ b	۳۳/۵ ab	۳۳/۴ b	۹۵/۴ ab
ویرجینیامايسین	۶۶/۳	۴۵/۵ ab	۴۱/۰	۲۶/۰	۴۱/۰	۲/۰
SEM	۲۹/۰	ns	*	*	ns	*
معنی داری						

a-c: در هر ستون اعدادی که با حروف غیر مشترک نشان داده شده است، دارای اختلاف معنی داری می باشند ($p < 0.05$).

جدول ۳- تأثیر عصاره‌های گیاهی و آنتی‌بیوتیک بر لیپیدهای سرم جوجه‌های گوشتشی

نوع تیمار	تری‌گلیسرید ۴۲ روزگی	کلسترول ۴۲ روزگی	۴۲ LDL روزگی	۴۲ HDL روزگی
	(mg/dl)	(mg/dl)	(mg/dl)	(mg/dl)
شاهد	۴/۱۵۸ a	۶۹/۱۷۵ b	۰۵/۷۷ a	۶۶/۵۰ bc
بابونه	۱۴۹ ab	۵۳/۱۶۲ ab	۴۹/۷۷ a	۰۰۸/۴۸
بومادران	۱۵۰ ab	۱۱/۱۶۷ ab	۱۲/۵۰ ab	۷/۶۲ abc
اکالیپتوس	۲/۱۴۹ ab	۹۷/۱۶۹ ab	۶۷/۴۷ b	۰۸/۷۰ a
شیرین بیان	۷/۱۴۸ ab	۷۷/۱۵۹ ab	۶۸/۵۸ ab	۲۱/۶۷ ab
سیر	۱۴۰ b	۱۵۱ b	۵۸/۵۴ ab	۰۵/۶۱ abc
زیره سیاه	۱۵۱ ab	۱۵/۱۶۱ ab	۲۷/۵۴ ab	۵۹/۵۲ abc
ویرجینیا میسین	۲/۱۶۰ a	۵۳/۱۶۴ ab	۲۱/۵۹ ab	۵۱/۴۹ bc
SEM	۰۳/۱	۲/۲	۳/۳	۳۵/۲
معنی داری	*	*	*	*

a-c در هر ستون اعدادی که با حروف غیرمشترک نشان داده شده است، دارای اختلاف معنی‌داری می‌باشد (p < 0.05).

شیرین بیان وجود دارند و دارای خاصیت ضدبакتریایی، ضدقارچی، ضدپیروزی و ضدالتهاب می‌باشند (Nowakowska, 2006). در آزمایش‌های صدقی و همکاران (۱۳۸۹) با استفاده از شیرین بیان افزایش تعداد سلول‌های گلبول سفید، افزایش تیتر SRBC و همچنین IgG مشاهده شد. Marco و همکاران (۱۹۹۶) گزارش کردند که اجزای فعال بابونه (فلاؤنوتیدها، روغن‌های ضروری، کامازولن (chamazule) و بیسابولول (bisabolol) عملکردی مشابه پریوپیوتیک‌ها در دستگاه گوارش دارند و مشابه آنها ضدبakterی، ضدقارچ و ضدالتهاب می‌باشند که باعث تحریک سیستم ایمنی در طیور می‌شوند. بابونه همچنین باعث کاهش اکسیداسیون اسیدهای چرب غیراشبع، جلوگیری از تولید MDA، و آزاد شدن آنزیم‌های LDH و AST و باعث مهار پراکسیداسیون لیپیدها می‌شود (عسگری و همکاران، ۱۳۸۰).

کاهش سطح کلسترول در سرم به علت وجود ترکیب‌هایی (مانند ترکیب‌های اورگانوسولفور در سیر) است که بر متابولیسم کلسترول اثر می‌گذارند. این ترکیب‌ها با جلوگیری از ترشح آنزیم‌هایی که در کبد در تبدیل استات به کلسترول نقش اساسی

بحث

در تحقیقات انجام شده در زمینه‌های انسانی مشخص شده است که گیاهان دارویی دارای اجزای فعالی می‌باشند که تحریک‌کننده سیستم ایمنی می‌باشند، مانند (جین‌سینگ (Ginseng) با ساپونین‌های استروئیدی که روحی تولید سایتونکین‌های IL-1, IL-6, IL-12, فاکتور نکروزکننده تومور آلفا و همچنین اینترفرون گاما) فعالیت ماکروفازها و لنفوцит‌ها (Tan & Vanitha, 2004) و فعالیت ضدالتهابی (Ginko biloba) با فلاونوتونکنندهای فعال و ترپین‌ها که تولیدکننده سایتونکین‌های پیش‌التهابی می‌باشند. ترکیب‌های سولفوره سیر مسئول تحریک سیستم ایمنی می‌باشند (Lau et al., 1991)، مواد فعال سیر باعث تحریک سلول‌های NK و همچنین باعث افزایش فعالیت آکالین (Platel & Srinivasan, 2004) در آزمایش Hassan و همکاران (۲۰۱۱)، تیتر آنتی‌بادی تولید شده علیه بیماری نیوکاسل و آنفلوانزای مرغی تولید شده در گروه تغذیه شده با اکالیپتوس بیشتر بود. وزن نسبی طحال و نیموس در گروه تغذیه شده با اکالیپتوس افزایش یافته بود. چالکون‌ها (Chalcones) موادی هستند که در

پیدا می‌کند. البته این احتمال وجود دارد که در غیاب تحریک اینمی، نیاز به انرژی برای ایجاد پاسخ اینمی کاهش یابد، در این حالت انرژی اضافه قابل دسترس (احتمالاً در فرم استیل-کوآ) صرف افزایش سنتز بافت چربی و کلسترول می‌شود که این امر منجر به افزایش چربی حفره بطنی و کلسترول سرم می‌گردد (Humprey *et al.*, 2002).

سپاسگزاری

از همکاری مدیریت محترم مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور به وزیر سرکار خانم دکتر فاطمه سفیدکن و شرکت گیاهان دارویی زردبند تهران در تأمین عصاره‌های گیاهی تقدیر و تشکر می‌شود.

منابع مورد استفاده

- صدقی، م.، گلیان، ا. و سلیمانی، ب.، ۱۳۸۹. تأثیر استفاده از عصاره شیرین‌بیان بر سطح اینمی، پارامترهای بیوشیمیایی و عملکرد مرغهای تخم‌گذار. آسیب‌شناسی درمانگاهی دامپزشکی (دامپزشکی تبریز)، ۴(۳): ۹۴۱-۹۳۳.
- عسگری، ص.، نادری، غ.، بشردوست، ن. و اطمینان، ز.، ۱۳۸۰. بررسی اثر آنتی‌اکسیدانی اسانس و عصاره بابونه بر سلول‌های کبدی موش صحرایی. گیاهان دارویی، ۱۱(۱): ۷۶-۶۹.
- Aoki, F., Honda, S., Kishida, H., Kitano, M., Arai, N., Tanaka, H., Yokota, S., Nakagawa, K., Asakura, T., Nakai, Y. and Mae, T., 2007. Suppression by licorice flavonoids of abdominal fat accumulation and body weight gain in high-fat diet-induced obese C57BL/6Jmice. *Bioscience Biotechnology Biochemistry*, 71: 206-214.
- Chen, H.L., Li, D.F., Chang, B.Y., Gong, L.M., Dai, J.G. and Yi, G.F., 2003. Effects of chinese herbal polysaccharides on the immunity and growth performance of young broiler. *Poultry Science*, 82(3): 364-370.
- Craig, W.J., 1999. Health promoting properties of common herbs. *American Journal of Clinical Nutrition*, 70(3 Suppl): 491S-499S.
- Farag, R.S., Badei, A.Z.M.A., Hewedi, F.M. and El-Baroty, G.S.A., 1989. Antioxidant activity of some spice essential oils on linoleic acid oxidation in aqueous media. *Journal of the American Oil Chemistry Society*, 66(6): 792-799.

دارند، باعث کاهش بیوسنتر کلسترول در کبد و کاهش غلظت آن در پلاسمای شوند (Liu & Yeh, 2000). کاهش کلسترول و تری‌گلیسرید در سرم به این دلیل است که در گیاهان قسمت‌های فعالی مانند تیمول و کارواکرول (گیاهانی مانند شیرین‌بیان) وجود دارد که کاهش‌دهنده پارامترهای مضر در خون می‌باشد (Jafari, 2011). همچنین می‌تواند به دلیل کاهش ترشح هورمون‌های غدد آدرنال باشد که باعث کاهش ترشح چربی از بافت آدیپوز یا اکسیداسیون چربی می‌شود که منجر به کاهش سطح اسیدهای چرب از جمله کلسترول می‌شود. Aoki و همکاران (۲۰۰۷) با استفاده از real-time PCR و Microarray باعث کاهش بیان زن‌های مؤثر در سنتز و افزایش بیان زن‌های مؤثر در اکسیداسیون اسیدهای چرب می‌شود.

عصاره شیرین‌بیان احتمالاً از طریق فلاونوئیدهای هیپسپاگلابریدین B، هیپسپاگلابریدین A و فورمونوتین موجود در آن بر روی متابولیسم اسید آراشیدونیک تأثیر گذاشته و سبب کاهش تولید رادیکال‌های آزاد می‌گردد. این ترکیب‌ها همچنین خاصیت ضدپلاکتی، ضدالتهابی و آنتی‌اکسیدانی دارند (Somjen *et al.*, 2004).

کاهش اکسیداسیون LDL کلسترول به هنگام مصرف شیرین‌بیان شاید به دلایلی از قبیل متصل شدن ترکیب‌های آن به LDL کلسترول، از بین بردن رادیکال‌های آزاد و حفاظت آنتی‌اکسیدانی‌های مربوط به اکسیده شدن کلسترول مثل کاتتوئیدها باشد. اثرات بازدارنده‌گی عصاره شیرین‌بیان بر روی تجمیع LDL کلسترول توسط Fuhrman و همکاران (۲۰۰۲) گزارش شده است.

با توجه به نقش باکتری‌هایی نظیر لاکتوباسیلوس‌ها و بیفیدوباکترها در کاهش کلسترول خون و همچنین نقش آنتی‌بیوتیک ویرجینیامايسین در مهار باکتری‌های گرم مشبت (نظیر لاکتوباسیلوس‌ها و بیفیدوباکترها) به دلیل نقش ضدباکتریایی ویرجینیامايسین علیه باکتری‌های گرم مشبت احتمال دارد که آنتی‌بیوتیک‌ها کلسترول سرم را افزایش دهند. همچنین گزارش شده که هنگام استفاده از آنتی‌بیوتیک در نتیجه کاهش بار میکروبی روده، تحریک اینمی کاهش

- Marco, J.A., Sanz-Cervera, J.F., Morante, M.D., Garcia-Lliso, V., Valles-Xirau, J. and Jakupovic, J., 1996. Tricyclic sesquiterpenes from *Artemisia chamaemelifolia*. *Phytochemistry*, 41(3): 837-844.
- Nowakowska, Z., 2006. A review of anti-infective and anti-inflammatory chalcones. *European Journal of Medicinal Chemistry*, 42(2): 125-137.
- Platel, K. and Srinivasan, K., 2004. Digestive stimulant action of spices: a myth or reality. *Indian Journal of Medical Research*, 119(5): 167-179.
- Reis, L.S., Pardo, P.E., Oba, E., Kronka Sdo, N. and Frazattii-Gallina, N.M., 2006. *Matricaria chamomilla* CH12 decrease handling stress in Nelore valves. *Journal Veterinary Science*, 7(2): 189-192.
- Sedghi, M., Golian, A., Kermanshahi, H. and Ahmadi, H., 2010. Effect of dietary supplementation of licorice extract and a prebiotic on performance and blood metabolites of broilers. *South African Journal of Animal Science*, 40(4): 371-380.
- Shikov, A.N., Pozharitskaya, O.N., Markarov, V.G. and Kvrentnaya, A.S., 2008. Antibacterial activity of *Chamomilla recutita* oil extract against helicobacter pylori. *Phytotherapy Research*, 22(2): 252-253.
- Somjen, D.K., Knoll, E., Vaya, J., Stern, N. and Tamir, S., 2004. Estrogen-like activity of licorice root constituents glabridin and glabrene in vascular tissues *in vitro* and *in vivo*. *Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology*, 91(3): 147-155.
- Tan, B.K.H. and Vanitha, J., 2004. Immunomodulatory and antimicrobial effects of some traditional Chinese medicinal herbs: a review. *Current Medicine Chemistry*, 11(11): 1423-1430.
- Warshafsky, S., Kamer, R.S. and Sivak, S.L., 1993. Effects of garlic on total serum cholesterol. A meta-analysis. *Annual International Medicine*, 119: 599-605.
- Yakhkeshi, S., Rahimi, S., Niknam, A. and Hoseinian, H., 2010. Effects of yarrow (*Achillea millefolium*) levels on carcass characteristics, serum lipids and immune response of broilers. *XIIIth European Poultry Conference*, 10: 23-27.
- Yalçın, S., Onbaşilar, E.E. Reisli, Z. and Yalçın, S., 2006. Effect of garlic powder on the performance, egg traits and blood parameters of laying hens. *Journal of the Science of Food and Agriculture*, 86(9): 1336-1339.
- Zhang, F., Chen, B., Xiao, S. and Yao, S.Z., 2005. Optimization and comparison of different extraction techniques for sanguinarine and chelerythrine in fruits of *Macleaya cordata* (Willd) R. Br. *Separation and Purification Technology*, 42(3): 283-290.
- Francesch, M., Brufau, J., Badiola, I., Liaurado, L.I. and Liach, J.R., 1999. Effects of the essential oil blend CRINA HC in feed on the broiler performance and digesta viscosity. *12th European Symposium on Poultry Nutrition*, Veldhoven (Holland), 15-19 August: 128.
- Fuhrman, B., Volkova, N., Kaplan, M., Presser, D., Attias, J., Hayek, T. and Aviram, M., 2002. Antiatherosclerotic effects of licorice extract supplementation on patients: increased resistance of LDL to atherogenic modifications, reduced plasma lipid levels, and decreased systolic blood pressure. *Nutrition*, 18(3): 268-273.
- Hassan, M.S.H., El-Sanhoury, M.H., Ali, W.A.H. and Ahmed, A.M.H., 2011. Effect of using eucalyptus leaves as natural additives on productive, physiological, immunological and histological performance of laying Japanese quail. *Egyptian Poultry Science*, 31(2): 305-329.
- Hosseini Mansoub, N. and Pooryousef Myandoab, M., 2012. Effect of dietary inclusion of alfalfa (*Medicago sativa*) and black cumin (*Nigella sativa*) on performance and some blood metabolites of Japanese quail. *Research Opinions in Animal & Veterinary Sciences*, 2:7-9.
- Humprey, B.D., Koutsos, E.A. and Klasing, K.C., 2002. Requirement and priorities of the immune system for nutrients: 69-77, In: Jacques, K.A. and Lyons, T.P., (Eds.). *Nutritional Biotechnology in the Feed and Food Industries: Proceeding of Alltech's 18th Annual Symposium*, 538p.
- Jafari, B., 2011. Influence of caraway on improve performance and blood parameters of Japanese quails. *Annals of Biological Research*, 2(6): 474-478.
- Jamroze, D., Bodkowski, R., Patkowska, B. and Sokota, A., 2004. Plant extracts-biological active substances in animal nutrition. *Polskie Drobjarstwo*, 6: 27-30.
- Jukic, M. and Molis, M., 2005. Catalytic oxidation and antioxidant properties of thyme essential oil (*Thymus vulgaris* L). *Croatica Chemica Acta* ccacaa, 78(1) 105-110.
- Konjufca, V.H., Pesti, G.M. and Bakalli, R.I., 1997. Modulation of cholesterol levels in broiler meat by dietary garlic and copper. *Poultry Science*, 76(9): 1264-1271.
- Lau, B.H., Yamasaki, T. and Gridley, D.S., 1991. Garlic compounds modulate macrophage and T-lymphocyte functions. *Molecular Biotherapy*, 3(2): 103-107.
- Liu, L. and Yeh, Y.Y., 2000. Inhibition of cholesterol biosynthesis by organosulfur compounds derived from garlic. *Lipids*, 35(2): 197-203.

Comparing the effects of six herbal extracts and antibiotic virginiamycin on immune response and serum lipids in broiler chickens

B. Karimi¹, Sh. Rahimi^{2*} and M.A. Karimi Torshizi³

1- MSc. Student, Department of Poultry Science, Faculty of Agriculture, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

2*- Corresponding author, Department of Poultry Science, Faculty of Agriculture, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

E-mail: rahimi_s@modares.ac.ir

3- Department of Poultry Science, Faculty of Agriculture, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

Received: January 2013

Revised: June 2013

Accepted: July 2013

Abstract

The study was conducted to evaluate the effects of medicinal plants on growth performance, immune system and blood parameters of broilers. In this study, a total of 480 one-day-old male broiler chicks (Ross 308) were randomly allocated to eight experimental groups, each with three replications and 20 birds in each replicate. The basal diet was consumed with 15-ppm virginiamycin and the plant extracts of Eucalyptus (*Eucalyptus globulus* L.), German chamomile (*Matricaria chamomilla* L.), Yarrow (*Achillea millefolium* L.), Iranian caraway (*Bunium persicum* (Boiss.) B. Fedtsch.), Garlic (*Allium sativum* L.) and licorice (*Glycyrrhiza glabra* L.), at 0.1% in drinking water. At day 41, three birds of each experimental unit were bled to measure haematocrit, cholesterol, triglyceride, total protein, uric acid, LDL and HDL. The birds were vaccinated against Newcastle disease (ND) via drinking water at day 23 and blood samples were taken at days 34 and 41. The highest ND titer and antibody titer to SRBC was observed in German chamomile group and eucalyptus group ($p<0.05$), respectively. The highest level of serum triglyceride was observed in virginiamycin group at day 42; however, it was not statistically significant with control group ($p<0.05$). The lowest level of cholesterol was measured in garlic group ($p<0.05$), and the lowest level of LDL was determined in eucalyptus group ($p<0.05$).

Keywords: Broilers, herbal extract, virginiamycin, immune system.